

## 膵がん(Pancreatic Cancer)

レジメン名	略語	一般名	投与量	投与方法	投与時間	投与日	1コース	補足
S-1 単剤	S-1	テガフル・キメラシル・オテラシル	40～60mg/回	経口	1日2回	d1-28	6週毎	JASPAC-01試験 GEST試験
GEM	GEM	ゲムシタビン	1000mg/m <sup>2</sup>	点滴	30分	d1・8・15	4週毎	JSAPAC-02試験 CONKO-001試験
GS	GEM	ゲムシタビン	1000mg/m <sup>2</sup>	点滴	30分	d1・8	3週毎	40～60mg/回あり
	S-1	テガフル・キメラシル・オテラシル	30～50mg/回	経口	1日2回	d1-14		
GEM+Erlo	GEM	ゲムシタビン	1000mg/m <sup>2</sup>	点滴	30分	d1・8・15	4週毎	
	Erlo	エルロチニブ	100mg/日	経口	1日1回	連日		
GEM+nab-PAC	GEM	ゲムシタビン	1000mg/m <sup>2</sup>	点滴	30分	d1・8・15	4週毎	MPACT試験 J-0107試験
	nab-PAC	nabパクリタキセル	125mg/m <sup>2</sup>	点滴	30分	d1・8・15		

FOLFIRINOX	L-OHP	オキサリプラチン	85mg/m <sup>2</sup>	点滴	2時間	d1	2週毎	ACCORD11試験
	I-LV	レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>	点滴	2時間	d1		
	CPT-11	イリノテカン	180mg/m <sup>2</sup>	点滴	2時間	d1		
	5-FU(b)	フルオロウラシル	400mg/m <sup>2</sup>	点滴	10分	d1		
	5-FU(c)	フルオロウラシル	2400mg/m <sup>2</sup>	点滴	46時間	d1-3		
mFOLFIRINOX (modified)	L-OHP	オキサリプラチン	85mg/m <sup>2</sup>	点滴	2時間	d1	2週毎	JASPAC-06試験
	I-LV	レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>	点滴	2時間	d1		
	CPT-11	イリノテカン	150mg/m <sup>2</sup>	点滴	2時間	d1		
	5-FU(c)	フルオロウラシル	2400mg/m <sup>2</sup>	点滴	46時間	d1-3		
NaI-IRI+5FU/I-LV	NaI-IRI	リボソームイリノテカン	70mg/m <sup>2</sup>	点滴	90分	d1	2週毎	NAPOLI-1試験 331501試験
	I-LV	レボホリナート	200mg/m <sup>2</sup>	点滴	2時間	d1		
	5-FU(c)	フルオロウラシル	2400mg/m <sup>2</sup>	点滴	46時間	d1-3		
リムパーザ®	Olaparib	オラパリブ	300mg/回	経口	1日2回	連日	-	BRCA遺伝子変異陽性

## 胆道がん(Biliary Tract Cancer)

レジメン名	略語	一般名	投与量	投与法	投与時間	投与日	1コース	補足
S-1 単剤	S-1	テガフル・キメラシル・オテラシル	40～60mg/回	経口	1日2回	d1-28	6週毎	2週投与1週休薬あり
GC	GEM	ゲムシタビン	1000mg/m <sup>2</sup>	点滴	30分	d1・8	3週毎	ABC-02試験 BT-22試験
	CDDP	シスプラチン	25mg/m <sup>2</sup>	点滴	60分	d1・8		
イミフィンジ® Durva+GC	Durva	デュルバルマブ	1500mg固定/回	点滴	60分	d1	3週毎	TOPAZ-1試験 8コース
	GEM	ゲムシタビン	1000mg/m <sup>2</sup>	点滴	30分	d1・8		
	CDDP	シスプラチン	25mg/m <sup>2</sup>	点滴	60分	d1・8		
イミフィンジ®	Durva	デュルバルマブ	1500mg固定/回	点滴	60分	d1	4週毎	TOPAZ-1試験
キイトルーダ®+GC	Pembro	ペムブロリズマブ	200mg固定/回	点滴	30分	d1	3週毎	KEYNOTE-966 8コース
	GEM	ゲムシタビン	1000mg/m <sup>2</sup>	点滴	30分	d1・8		
	CDDP	シスプラチン	25mg/m <sup>2</sup>	点滴	60分	d1・8		
GS	GEM	ゲムシタビン	1000mg/m <sup>2</sup>	点滴	30分	d1・8	3週毎	FUGA-BT JCOG1113試験
	S-1	テガフル・キメラシル・オテラシル	30～50mg/回	経口	1日2回	d1-14		
GCS	GEM	ゲムシタビン	1000mg/m <sup>2</sup>	点滴	30分	d1	2週毎	KHBO1401試験 -MITSUBA
	CDDP	シスプラチン	25mg/m <sup>2</sup>	点滴	60分	d1		
	S-1	テガフル・キメラシル・オテラシル	40～60mg/回	経口	1日2回	d1-7		
ペマジール®	PEMI	ペミガチニブ	13.5mg/回	経口	1日1回	d1-14	3週毎	FGFR2融合遺伝子陽性

胆道がん(Biliary Tract Cancer)

## 肝臓がん(Liver Cancer)

レジメン名	略語	一般名	投与量	投与方法	投与時間	投与日	1コース	補足
ミリプラ®-TACE	MIRIPLA	ミリプラチン	~120mg/回	肝動注	-	d1	4週毎	肝動脈化学塞栓療法
ネクサバル®	Sor	ソラフェニブ	400mg/回	経口	1日2回	連日	-	1次治療
レンビマ®	Len	レンバチニブ	8 or 12mg/回	経口	1日1回	連日	-	1次治療
スチバーガ®	Rego	レゴラフェニブ	160mg/回	経口	1日1回	d1-21	4週毎	2次治療 RESORCE
カボメティックス®	Cabo	カボザンチニブ	60mg/回	経口	1日1回	連日	空腹時	2次治療
イミフィンジ®+ イジユド®(STRIDE)	Durva	デュルバルマブ	1500mg固定/回	点滴	60分	d1	4週毎	HIMALAYA試験
	Tremeli	トレメリマブ	300mg固定/初回のみ	点滴	60分	d1初回のみ		
イミフィンジ®	Durva	デュルバルマブ	1500mg固定/回	点滴	60分	d1	4週毎	20mg/kg(30kg以下)

サイラムザ®	RAM	ラムシルマブ	8mg/kg	点滴	60⇒30分	d1	2週毎	2次治療 REACH試験 AFP≥400ng/mL
Low-dose FP	5-FU	フルオロウラシル	250mg/回	肝動注	5時間	d1-5	1週毎	肝動注化学療法
	CDDP	シスプラチン	10mg/回	持続	30分	d1-5		
BEV+テセントリク®	BEV	ベバシズマブ	15mg/kg	点滴	90⇒60⇒30分	d1	3週毎	IMbrave150 PD(増悪)まで
	Atezo	アテゾリズマブ	1200mg固定/回	点滴	60⇒30分	d1		

肝臓がん(Liver Cancer)