

乳がん(Breast Cancer)

・d1=1日目、d1-14=初日から14日間

| レジメン名 | 略語 | 一般名 | 投与量 | 投与方法 | 投与時間 | 投与日 | 1コース | 補足 |
|-----------|-------|----------|-------------------------|------|------|-------------|--------|----------------|
| タモキシフェン® | TAM | タモキシフェン | 20mg/回 | 経口 | 1日1回 | 連日 | - | SERM、閉経前・後 |
| フェアストン® | TOR | トレミフェン | 40mg/回 | 経口 | 1日1回 | 連日 | - | 閉経後 |
| LH-RHアナログ | ZOL | ゴセレリン | 3.6mg、10.8mg/回 | 皮下注 | - | 1or3ヶ月製剤 | - | 閉経前 |
| LH-RHアナログ | LEU | リュープロレリン | 3.75mg、11.25mg、22.5mg/回 | 皮下注 | - | 1or3or6ヶ月製剤 | - | 閉経前 |
| アナストロゾール® | ANA | アナストロゾール | 1mg/回 | 経口 | 1日1回 | 連日 | - | 閉経後 5年間 |
| レトゾール® | LET | レトゾール | 2.5mg/回 | 経口 | 1日1回 | 連日 | - | 閉経後 5年間 |
| アロマシン® | EXE | エキスメスタン | 25mg/回 | 経口 | 1日1回 | 連日 | - | 閉経後 |
| フェソロデックス® | FUL | フルベストラント | 250mg × 2/回 | 筋注 | 1日1回 | d1・15・29 | 以降4週毎 | SERD、閉経前・後 |
| ベージニオ® | Abema | アベマシクリブ | 150mg/回 | 経口 | 1日2回 | 連日 | 最長24ヶ月 | MONARCH E試験 術後 |

| レジメン名 | 略語 | 一般名 | 投与量 | 投与方法 | 投与時間 | 投与日 | 1コース | 補足 |
|---------------|------|-----------|----------------------|------|------|-----|------|---------------------|
| AC | ADM | ドキシソルビシン | 60mg/m ² | 点滴 | 15分 | d1 | 3週毎 | 術前・術後4コース |
| | CPA | シクロホスファミド | 600mg/m ² | 点滴 | 30分 | d1 | | |
| EC | EPI | エピルビシン | 90mg/m ² | 点滴 | 15分 | d1 | 3週毎 | 術前・術後4コース |
| | CPA | シクロホスファミド | 600mg/m ² | 点滴 | 30分 | d1 | | |
| dose-denseAC | ADM | ドキシソルビシン | 60mg/m ² | 点滴 | 15分 | d1 | 2週毎 | 術前・術後 Peg-GCSF併用 |
| | CPA | シクロホスファミド | 600mg/m ² | 点滴 | 30分 | d1 | | |
| dose-densePTX | PTX | パクリタキセル | 175mg/m ² | 点滴 | 180分 | d1 | 2週毎 | |
| FEC100 | 5-FU | フルオロウラシル | 500mg/m ² | 点滴 | 15分 | d1 | 3週毎 | 術前・術後 3-6コース |
| | EPI | エピルビシン | 100mg/m ² | 点滴 | 15分 | d1 | | |
| | CPA | シクロホスファミド | 500mg/m ² | 点滴 | 30分 | d1 | | |
| TC | DTX | ドセタキセル | 75mg/m ² | 点滴 | 60分 | d1 | 3週毎 | 術前・術後4コース |
| | CPA | シクロホスファミド | 600mg/m ² | 点滴 | 30分 | d1 | | |
| PTX | PTX | パクリタキセル | 80mg/m ² | 点滴 | 60分 | d1 | 1週毎 | 術前・術後12コース |
| DTX | DTX | ドセタキセル | 75mg/m ² | 点滴 | 60分 | d1 | 3週毎 | 術前・術後4コース |

| レジメン名 | 略語 | 一般名 | 投与量 | 投与法 | 投与時間 | 投与日 | 1コース | 補足 |
|-------------------------|--------|----------------|----------------------|-----|---------|---------|------|--|
| Pembro+CBDCA +PTX | Pembro | ペムブロリズマブ | 200mg固定/回 | 点滴 | 30分 | d1 | 3週毎 | KEYNOTE-522 術前 HR-/HER- 高リスク早期TNBC |
| | CBDCA | カルボプラチン | AUC5 | 点滴 | 60分 | d1 | | |
| | PTX | パクリタキセル | 80mg/m ² | 点滴 | 60分 | d1・8・15 | | |
| Pembro+dd-CBDCA +PTX | Pembro | ペムブロリズマブ | 200mg固定/回 | 点滴 | 30分 | d1 | 3週毎 | KEYNOTE-522 術前 HR-/HER- 高リスク早期TNBC |
| | CBDCA | カルボプラチン | AUC1.5 | 点滴 | 60分 | d1・8・15 | | |
| | PTX | パクリタキセル | 80mg/m ² | 点滴 | 60分 | d1・8・15 | | |
| Pembro+AC | Pembro | ペムブロリズマブ | 200mg固定/回 | 点滴 | 30分 | d1 | 3週毎 | KEYNOTE-522 術前 HR-/HER- 高リスク早期TNBC |
| | ADM | ドキシソルビシン | 60mg/m ² | 点滴 | 15分 | d1 | | |
| | CPA | シクロホスファミド | 600mg/m ² | 点滴 | 30分 | d1 | | |
| Pembro+EC | Pembro | ペムブロリズマブ | 200mg固定/回 | 点滴 | 30分 | d1 | 3週毎 | KEYNOTE-522 術前 HR-/HER- 高リスク早期TNBC |
| | EPI | エピルビシン | 90mg/m ² | 点滴 | 15分 | d1 | | |
| | CPA | シクロホスファミド | 600mg/m ² | 点滴 | 30分 | d1 | | |
| キイトルーダ® | Pembro | ペムブロリズマブ | 200mg固定/回 | 点滴 | 30分 | d1 | 3週毎 | 術後9回まで |
| | | | 400mg固定/回 | | | | 6週毎 | 術後5回まで |
| レジメン名 | 略語 | 一般名 | 投与量 | 投与法 | 投与時間 | 投与日 | 1コース | 補足 |
| トラスツズマブ® | T-mab | トラスツズマブ | 初回4mg/kg、維持2mg/kg | 点滴 | 90⇒30分 | d1 | 1週毎 | |
| | T-mab | トラスツズマブ | 初回8mg/kg、維持6mg/kg | 点滴 | 90⇒30分 | d1 | 3週毎 | |
| カドサイラ® | T-DM 1 | トラスツズマブ・エムタンシン | 3.6mg/kg | 点滴 | 90⇒30分 | d1 | 3週毎 | 術後は14回 |
| フェスゴ®配合IN | PHESGO | ペルツズマブ・トラスツズマブ | 1200/600(IN) | 皮下 | 初回8分以上 | d1 | 3週毎 | 術前術後は12か月 |
| フェスゴ®配合MA | PHESGO | ペルツズマブ・トラスツズマブ | 600/600(IN) | 皮下 | 2回目5分以上 | d1 | 3週毎 | |
| HPD (HP±DTX) | T-mab | トラスツズマブ | 初回8mg/kg、維持6mg/kg | 点滴 | 90⇒30分 | d1 | 3週毎 | CLEOPATRA試験 |
| | PER | ペルツズマブ | 初回840mg/回、維持420mg/回 | 点滴 | 60⇒30分 | d1 | | |
| | DTX | ドセタキセル | 75mg/m ² | 点滴 | 60分 | d1 | | |
| T-mab+DTX | T-mab | トラスツズマブ | 初回8mg/kg、維持6mg/kg | 点滴 | 90⇒30分 | d1 | 3週毎 | |
| | DTX | ドセタキセル | 75mg/m ² | 点滴 | 60分 | d1 | | |
| T-mab+DTX+ CBDCA±Per | T-mab | トラスツズマブ | 初回8mg/kg、維持6mg/kg | 点滴 | 90⇒30分 | d1 | 3週毎 | |
| | PER | ペルツズマブ | 初回840mg/回、維持420mg/回 | 点滴 | 60⇒30分 | d1 | | |
| | CBDCA | カルボプラチン | AUC6 | 点滴 | 60分 | d1 | | |
| | DTX | ドセタキセル | 75mg/m ² | 点滴 | 60分 | d1 | | |

| レジメン名 | 略語 | 一般名 | 投与量 | 投与法 | 投与時間 | 投与日 | 1コース | 補足 |
|---------------|-------|---------|----------------------|-----|--------|------|------|----|
| T-mab+VNB±Per | T-mab | トラスツズマブ | 初回8mg/kg、維持6mg/kg | 点滴 | 90⇒30分 | d1 | 3週毎 | |
| | PER | ペルツズマブ | 初回840mg/回、維持420mg/回 | 点滴 | 60⇒30分 | d1 | | |
| | VNB | ビノレルビン | 25mg/m ² | 点滴 | 5分 | d1・8 | | |
| T-mab+ERI±Per | T-mab | トラスツズマブ | 初回8mg/kg、維持6mg/kg | 点滴 | 90⇒30分 | d1 | 3週毎 | |
| | PER | ペルツズマブ | 初回840mg/回、維持420mg/回 | 点滴 | 60⇒30分 | d1 | | |
| | ERI | エリブリン | 1.4mg/m ² | 点滴 | 5分 | d1・8 | | |

| | | | | | | | | |
|-----------|--------|------------|-----------------------|----|-----|------------|-----|----------------------|
| EC60 | EPI | エピルビシン | 60mg/m ² | 点滴 | 15分 | d1 | 3週毎 | |
| | CPA | シクロホスファミド | 600mg/m ² | 点滴 | 30分 | d1 | | |
| FEC60 | 5-FU | フルオロウラシル | 500mg/m ² | 点滴 | 15分 | d1 | 3週毎 | |
| | EPI | エピルビシン | 60mg/m ² | 点滴 | 15分 | d1 | | |
| | CPA | シクロホスファミド | 500mg/m ² | 点滴 | 30分 | d1 | | |
| DTX60 単剤 | DTX | ドセタキセル | 60mg/m ² | 点滴 | 60分 | d1 | 3週毎 | |
| nabPTX 単剤 | nabPTX | nabパクリタキセル | 260mg/m ² | 点滴 | 30分 | d1 | 3週毎 | |
| ハラヴェン® | ERI | エリブリン | 1.4mg/m ² | 点滴 | 5分 | d1・8 | 3週毎 | |
| ナベルピン® | VNB | ビノレルビン | 25mg/m ² | 点滴 | 5分 | d1・8 | 3週毎 | |
| CPT-11 単剤 | CPT-11 | イリノテカン | 100mg/m ² | 点滴 | 90分 | d1・8・15・22 | 7週毎 | |
| GEM 単剤 | GEM | ゲムシタビン | 1250mg/m ² | 点滴 | 30分 | d1・8 | 3週毎 | |
| GEM+PTX | GEM | ゲムシタビン | 1250mg/m ² | 点滴 | 30分 | d1・8 | 3週毎 | |
| | PTX | パクリタキセル | 175mg/m ² | 点滴 | 60分 | d1 | | |
| キイトルーダ® | Pembro | ペムブロリズマブ | 200mg固定/回 | 点滴 | 30分 | d1 | 3週毎 | MSI-High TMB-High |
| | | | 400mg固定/回 | | | | 6週毎 | |

| レジメン名 | 略語 | 一般名 | 投与量 | 投与法 | 投与時間 | 投与日 | 1コース | 補足 |
|----------------------|--------|------------------|-----------------------|-----|------------|---------|------|--|
| BEV+PTX | BEV | ベバシズマブ | 10mg/kg | 点滴 | 90⇒60⇒30分 | d1・15 | 4週毎 | E2100試験 |
| | PTX | パクリタキセル | 90mg/m ² | 点滴 | 60分 | d1・8・15 | | |
| Atezo+nabPTX | Atezo | アテゾリズマブ | 840mg固定/回 | 点滴 | 60⇒30分 | d1・15 | 4週毎 | IMpassion130 PD-L1(+), TNBC |
| | nabPTX | nabパクリタキセル | 100mg/m ² | 点滴 | 30分 | d1・8・15 | | |
| T-DXd 単剤 | T-DXd | トラスツズマブ・デルクスステカン | 5.4mg/kg | 点滴 | 90⇒30分 | d1 | 3週毎 | DESTINY-Breast01 |
| トロデルビ® | SG | サシツズマブ ゴビテカン | 10mg/kg | 点滴 | 120⇒60~120 | d1 | 3週毎 | ASCENT試験 |
| Pembro+GEM +CBDCA | Pembro | ペムブロリズマブ | 200mg固定/回 | 点滴 | 30分 | d1 | 3週毎 | KEYNOTE-355 PD-L1(+) CPS ≥ 10 TNBC |
| | GEM | ゲムシタビン | 1000mg/m ² | 点滴 | 30分 | d1・8 | | |
| | CBDCA | カルボプラチン | AUC2 | 点滴 | 60分 | d1・8 | | |
| Pembro+nabPTX | Pembro | ペムブロリズマブ | 200mg固定/回 | 点滴 | 30分 | d1 | 3週毎 | KEYNOTE-355 PD-L1(+) CPS ≥ 10 |
| | nabPTX | nabパクリタキセル | 100mg/m ² | 点滴 | 30分 | d1・8・15 | 4週毎 | |
| Pembro+PTX | Pembro | ペムブロリズマブ | 200mg固定/回 | 点滴 | 30分 | d1 | 3週毎 | KEYNOTE-355 PD-L1(+) CPS ≥ 10 |
| | PTX | パクリタキセル | 90mg/m ² | 点滴 | 60分 | d1・8・15 | 4週毎 | |

| レジメン名 | 略語 | 一般名 | 投与量 | 投与法 | 投与時間 | 投与日 | 1コース | 補足 |
|----------------------|-------|----------|-------------|-----|------|---------|------|-------------------------------|
| リムパーザ® | Ola | オラパリブ | 300mg/回 | 経口 | 1日2回 | 連日 | - | OlympiAD試験 |
| ゼジューラ® | Nira | ニラパリブ | 200mg/回 | 経口 | 1日1回 | 連日 | - | |
| イブランス®+ フェソロデックス® | Palbo | パルボシクリブ | 125mg/回 | 経口 | 1日1回 | d1-21 | 4週毎 | PALOMA-3 閉経問わず HR+/HER- |
| | FUL | フルベストラント | 250mg × 2/回 | 筋注 | 1日1回 | d1・(15) | | |
| イブランス®+ レトロゾール® | Palbo | パルボシクリブ | 125mg/回 | 経口 | 1日1回 | d1-21 | 4週毎 | PALOMA-2 閉経後 HR+/HER- |
| | LET | レトロゾール | 2.5mg/回 | 経口 | 1日1回 | 連日 | | |
| ベージニオ®+ フェソロデックス® | Abema | アベマシクリブ | 150mg/回 | 経口 | 1日2回 | 連日 | 4週毎 | MONARCH 2試験 閉経問わず HR+/HER- |
| | FUL | フルベストラント | 250mg × 2/回 | 筋注 | 1日1回 | d1・(15) | | |
| ベージニオ®+ アナストロゾール® | Abema | アベマシクリブ | 150mg/回 | 経口 | 1日2回 | 連日 | - | MONARCH 3試験 閉経後 HR+/HER- |
| | ANA | アナストロゾール | 1mg/回 | 経口 | 1日1回 | 連日 | | |
| ターゼナ® | TAL | クラゾパリブ | 1mg/回 | 経口 | 1日1回 | 連日 | | |

| レジメン名 | 略語 | 一般名 | 投与量 | 投与法 | 投与時間 | 投与日 | 1コース | 補足 |
|-----------|------|------------------|--------------------------|-----|------|-------|------|------------|
| Cape 単剤 | Cape | カペシタビン | 1250mg/m ² /回 | 経口 | 1日2回 | d1-14 | 3週毎 | |
| S-1 単剤 | S-1 | テガフル・キメラシル・オテラシル | 40~60mg/回 | 経口 | 1日2回 | d1-28 | 6週毎 | 2週投与1週休薬あり |
| UFT 単剤 | UFT | テガフル・ウラシル | 300mg/m ² /日 | 経口 | 1日3回 | 連日 | - | |
| Lapa+Cape | Lapa | ラパチニブ | 1250mg/回 | 経口 | 1日1回 | 連日 | 3週毎 | |
| | Cape | カペシタビン | 1000mg/m ² /回 | 経口 | 1日2回 | d1-14 | | |
| Lapa+AI | Lapa | ラパチニブ | 1250mg/回 | 経口 | 1日1回 | 連日 | - | |
| | ANA | アナストロゾール | 1mg/回 | 経口 | 1日1回 | 連日 | | |
| EVE+EXE | EVE | エベロリムス | 10mg/回 | 経口 | 1日1回 | 連日 | - | BOLERO試験 |
| | EXE | エキスメスタン | 25mg/回 | 経口 | 1日1回 | 連日 | | |

乳がん (Breast Cancer)