

## 骨髄異形成症候群 (Myelodysplastic Syndromes: MDS)

レジメン名	略語	一般名	投与量	投与方法	投与時間	投与日	1コース
レブラミド®	Len	レナリドミド	10mg/回	経口	1日1回	d1-21	4週毎
ビダーザ®	Aza	アザシチジン	75mg/m <sup>2</sup>	皮下、点滴	10分	d1-7	4週毎

骨髄異形成症候群 (Myelodysplastic Syndromes: MDS)

## 原発性マクログロブリン血症 (Waldenstrom macroglobulinemia)

レジメン名	略語	一般名	投与量	投与方法	投与時間	投与日	1コース
VD(BD)週2	BOR	ボルテゾミブ	1.3mg/m <sup>2</sup>	皮下、静注	-	d1・4・8・11	3週毎
	DEX	デキサメタゾン	20mg/日	経口	1日1回	d1・2・4・5・8・9・11・12	
DRC	DEX	デキサメタゾン	20mg/body	点滴	15分	d1	3週毎
	RTX	リツキシマブ	375mg/m <sup>2</sup>	点滴	2~4時間	d1	
	CPA	シクロホスファミド	100mg/m <sup>2</sup> /回	経口	1日2回	d1-5	
ベレキシブル®	-	チラブルチニブ	480mg/回	経口	1日1回	連日	-

原発性マクログロブリン血症 (Waldenstrom macroglobulinemia)

## 全身性ALアミロイドーシス (Systemic Amyloidosis)

レジメン名	略語	一般名	投与量	投与方法	投与時間	投与日	1コース
DARA-VCD(1コース) =DCyBorD	DARA	ダラツムマブ	1800mg/body	皮下	3-5分	d1・8・15・22	4週毎 3-6コースはDARAが d1・15
	BOR	ボルテゾミブ	1.3mg/m <sup>2</sup>	皮下	-	d1・8・15・22	
	CPA	シクロホスファミド	300mg/m <sup>2</sup> /回	経口	1日1回	d1・8・15・22	
	DEX	デキサメタゾン	20mg/日	経口	1日1回	d1・2・8・9・15・16・22・23	
DARA-VCD (7コース以降)	DARA	ダラツムマブ	1800mg/body	皮下	1日1回	d1	4週毎
	DEX	デキサメタゾン	20mg/日	経口	1日1回	d1	

全身性ALアミロイドーシス (Systemic Amyloidosis)